

CHYMORAL

Comprimidos

Tripsina + Quimotripsina Comprimidos

Composição:

Cada comprimido com revestimento entérico contém:

Tripsina BP + Quimotripsina BP (6:1)

equivalente a 50.000 unidades USP de atividade da enzima proteolítica

Excipientes q.s.

Cor aprovada usada.

Descrição: São enzimas pancreáticas que têm sido usadas localmente como a estreptocinase-estreptodornase.

Eles agem com mais proteína do que o último e também na mucina. Administradas oralmente, ambas as enzimas são provavelmente úteis para aliviar inflamações, hematomas e hematomas.

É possível que a quimotripsina oral reduza a viscosidade do escarro, embora não em pacientes com muco anormal (mucoviscidose).

Indicação: Terapia adjunta no tratamento do edema inflamatório devido a lesão, cirurgia, infecção ou procedimentos odontológicos.

Farmacologia: As células do pâncreas sintetizam e produzem enzimas digestivas que degradam gorduras (lipases), amidos (amilases) e proteínas (proteases). As proteases pancreáticas podem ser divididas em várias famílias de enzimas que diferem em estrutura e efeito catalítico na forma como interagem com as ligações peptídicas das proteínas. A tripsina e a quimotripsina são dois tipos de proteases originalmente sintetizadas no pâncreas na forma inativa dos precursores do zimógeno (tripsinogênio e quimotripsinogênio) com o objetivo de interromper a atividade celular desnecessária e controlar quando e onde ocorre a atividade enzimática. Os zimogênios são então transportados para a corrente sanguínea ou para os intestinos, onde são excretados ou são convertidos pelo processo de proteólise em enzimas ativas que auxiliam na digestão. Ao tomar a combinação tripsina-quimotripsina, as enzimas proteolíticas ativas estão sendo ingeridas e usadas em adição às formas inativas que o corpo produz naturalmente. A tripsina e a quimotripsina dão ao corpo o impulso extra que pode necessitar para uma digestão mais suave das proteínas, bem como para reduzir a inflamação e combater as infecções.

Dosagem: Dois comprimidos quatro vezes ao dia. Engula comprimidos inteiros meia hora antes das refeições. ou conforme indicado pelo médico.

Contraindicações: Hipersensibilidade.

Precauções Especiais: Pacientes com irregularidades do mecanismo de coagulação do sangue. Doença hepática ou renal grave.

Raramente, a quimotripsina pode causar uma reação alérgica quando tomada por via oral. Os sintomas incluem coceira, falta de ar, inchaço dos lábios ou garganta, choque, perda de consciência e morte.

Não deve ser utilizado em doentes com insuficiência hepática grave ou lesão renal ou irregularidades do mecanismo de coagulação do sangue.

Pediatria: use com cautela.

Gravidez: Use somente, se claramente indicado.

Idoso: use com cuidado

Armazenamento: Armazenar abaixo de 30°C em local seco, proteja da luz.

Mantenha os medicamentos fora do alcance das crianças.

Apresentação: Caixa de 3 embalagens Alu / Alu de 10 comprimidos cada.

Manufactured by:

